



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 3660 от « 27 » апреля 2022 г.

Настоящее свидетельство выдано
Синтезия Кеми ГмбХ (Германия)

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Сансэр Ультра, КС (317 г/л тебуконазола +

93 г/л флутриафола + 90 г/л азоксистробина)

получил государственную регистрацию за № 781-02-3660-1
на срок по « 26 » апреля 2032 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

№ 004097



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,25-0,3	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина жёлтая, пиренофороз (жёлтая пятнистость), септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации; против церкоспореллёза – конец кушения начало выхода в трубку; против фузариоза колоса – конец колошения - начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	40(1-2)
0,3	Пшеница озимая	Церкоспореллез, фузариоз колоса		
0,25-0,3	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая и тёмно-бурая пятнистости, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
0,3-0,4	Соя	Аскохитоз, церкоспороз, пероноспороз, альтернариоз, септориоз		

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

